

# ニューホルキス温感

(ニューホルキスオンカン)

<b>区分</b>	第3類医薬品					
<b>特徴</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった温感パップ剤です。</li> <li>●4種の有効成分(サリチル酸メチル、dl-カンフル、グリチルリチン酸、トウガラシエキス)の働きで、腰痛、肩こり、筋肉痛等によく効きます。</li> <li>●粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。</li> </ul>					
<b>成分/含量</b>	膏体100g(875cm <sup>2</sup> )中 サリチル酸メチル 1.0g、dl-カンフル 0.5g、グリチルリチン酸 0.03g、トウガラシエキス 0.22g(原生薬換算量2.75g) 添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸、エデト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有する。					
<b>効能または効果</b>	腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、しもやけ、骨折痛					
<b>用法/用量</b>	<用法・用量> 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。 <用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守すること。 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 (3)打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。 (4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。 (5)皮ふの弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。) (6)本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。 (7)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。 (8)本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないこと。(強い刺激を感じることもあるので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は、30分位してから使用すること。)					
<b>使用上の注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる。)</li> <li>次の部位には使用しないこと</li> <li>(1)目の周囲、粘膜等。</li> <li>(2)湿疹、かぶれ、傷口。</li> <li>●相談すること</li> <li>1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること</li> <li>(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。</li> <li>(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること</li> <li>(1)使用後、次の症状があらわれた場合</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、痛み</td> </tr> </tbody> </table> <li>(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合</li>		関係部位	症状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、痛み
関係部位	症状					
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、痛み					
<b>保管及び取り扱い上の注意</b>	(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。 (2)小児の手の届かない所に保管すること。 (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)					
<b>販売会社または取扱会社</b>	テイコクファルマケア株式会社					
<b>お問い合わせ先</b>	帝國製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0879-25-2363 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)					