

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

消炎鎮痛貼付剤 **キット[®]膏**

【特徴】

キット膏は、トウガラシの有効成分と同一作用を有するノニル酸ワニリルアミドの持続性刺激作用により、快い温感とともに皮ふ局所の血行を促進し、筋肉のこりをほぐし、痛みをやわらげるニオイの少ない温感プラスターです。



【使用上の注意】



してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

肩のこり、腰の痛み、神経痛、ロイマチス、打撲、捻挫、筋肉痛、関節痛、凍傷

【用法・用量】

薬面をおおっているライナーをはがし、患部の大小により適当量を1日1～2回お貼りください。

製造番号

使用期限

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 患部の皮ふは清潔にして、汗などをよく拭きとってからお貼りください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い個所に1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて貼るのはさけてください。
- (6) 貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量
酸化亜鉛	20.0g
ノニル酸ワニリルアミド	0.03g

添加物として香料、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、ポリブテン、エステルガム、脂肪族炭化水素樹脂、三酸化鉄を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口をきちんとしめ、外箱に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包装 40枚入(1枚：7cm×5.5cm)

○製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

発売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
お客様相談室 052-951-2340

製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地
電話 0942-83-2112

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)