

[効能・効果]

筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

[用法・用量]

1日4回を限度として、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5)本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (6)定められた用法、用量を厳守してください。

[成分・分量]

1g中：インドメタシン……………10mg

l-メントール……………30mg

添加物：液 ラウロマクロゴール、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、BHT、チオ硫酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール

クリーム ラウロマクロゴール、グリセリン、流動パラフィン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、トリエタノールアミン、塩酸、BHT、チオ硫酸Na、パラベン、カルボキシビニルポリマー

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)火気に近づけないでください(液)。
- (5)使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。〔受付時間9:00～17:00(土、日及び祝日を除く)〕

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号(076)472-0361

〒930-0344 富山県中新川郡上市町森元町7-2
