

この説明書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

添付文書改訂年月
2009年7月

©

第3類医薬品

ヘルspanE α

(ビタミンE主薬製剤)



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。
出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘、下痢

成分・分量

1日量(3カプセル)中

d- α -トコフェロール(ビタミンE).....300.0mg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁誘導体).....27.3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆).....30.0mg
イノシトールヘキサニコチン酸エステル.....150.0mg
ガンマーオリザノール.....10.0mg

添加物としてグリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、カプセル削皮の成分は、ゼラチン、濃グリセリン及び酸化チタンを含有する。

用法・用量

成人(15歳以上)1回1カプセル、1日3回食後服用する。


(裏面もお読み下さい)

効能・効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
更年期における次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ、月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
次の場合のビタミンEの補給:老年期

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 水分がカプセルに付きますと、内容成分の変化の原因となるので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



本製品内容についてのお問合せ

- ①お買い上げのお店
- ②発 売 元：明治薬品株式会社 お客様相談室
電 話：03-3253-3451
受 付 時 間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)
- ③発 売 元：天野商事株式会社 お客様相談室
電 話：052-951-2340
受 付 時 間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地

発売元
 **天野商事株式会社**
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元
 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地