

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

小青竜湯エキス配合
総合かぜ薬

ガン[®]顆粒SR

第2類医薬品



かぜをひくと、一般的に鼻水、くしゃみ、のどの痛みなどの症状があらわれます。さらに症状が進むと熱がでたり、からだが大のけい、せきがでるなどの症状になります。ガン顆粒SRはこうしたかぜの諸症状を緩和する成分とともに漢方処方である小青竜湯エキスを配合しました。特に鼻水が出て少し症状の進んだかぜにすぐれた効果をあらわします。

使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)
 - 服用時は飲酒しないでください
 - 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

【効能】

かぜの諸症状 鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み の緩和

【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回食後
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
3才以上7才未満	1/3包	
1才以上3才未満	1/4包	
1才未満	服用しないでください。	



用法・用量に関連する注意

1. 用法及び用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。


【主成分とその主な作用】

成 分	本品1日量 [3包(1包2g)] 中	主 な 作 用
小青竜湯乾燥エキス	900mg	鼻水、鼻づまり、のどの痛み、せきなどのあるかぜに効果があります。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき・たんをしずめます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg	のどにからむたんをやわらかくし、出しやすくします。
無水カフェイン	150mg	頭痛をしずめます。
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	12mg	かぜなどで消耗するビタミンの補給。

添加物としてサッカリンNa、乳糖、ケイ酸Al、ステアリン酸Mgを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
5. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた原料を使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能には変わりありません。
6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。

天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)

販売元

 天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

発売元

hoyu ホーユー株式会社
名古屋市中区徳川一丁目501

製造販売元

神農製薬株式会社
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1