

この添付文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

添付文書改訂年月
2009年5月

第②類医薬品

ベルゲンET

総合かぜ薬(リゾチーム塩酸塩・トラネキサム酸配合)

ベルゲンETは、アレルギーや炎症の抑制作用を持つトラネキサム酸に鼻やのどの炎症をしずめるリゾチーム塩酸塩の2つの成分をはじめ、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン薬などかぜの諸症状に適した成分を効果的に配合した総合かぜ薬です。ベルゲンETは、大人から子どもまで服用しやすい小型の錠剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等(例えば咽・喉頭、まぶた、口唇等のむくみ、ハレ))を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、トラネキサム酸を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、歯科口腔用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
8. 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等)及び血栓症を起こす恐れのある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状 |
|-----------|-----------------------------|
| 皮 心 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ |
| 精 神 神 経 系 | めまい |
| そ の 他 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|--|
| シ ョ ッ ク (アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝 機 能 障 害 | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。 |
| 間 質 性 肺 炎 | 空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。) |
| ぜんそく | |

(裏面もお読みください)

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
便秘、口のかわき、下痢

成分・分量と作用

| 成 分 | 成人1日量(9錠)中 | 症 状 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| アセトアミノフェン | 900.0mg | 熱を下げ、頭痛、悪寒、関節の痛み、のどの痛みをやわらげます。 |
| トラネキサム酸 | 420.0mg | アレルギーや鼻・のどの炎症をおさえます。 |
| リゾチーム塩酸塩 (リゾチームとして) | 60.0mg (力価) | 鼻やのどの炎症をしずめ、粘稠なたんを切れやすくします。 |
| チベジジンヒベンズ酸塩 | 75.0mg | 咳中枢に直接作用し、せき・たんをしずめます。 |
| d l - メ チ ル エフェドリン塩酸塩 | 60.0mg | 気管支をひろげ、せき・たんをしずめます。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3.5mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。 |
| 無水カフェイン | 75.0mg | 頭痛をやわらげます。 |

添加物として、乳糖水和物、セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、三酸化鉄、カルナウバロウ、ミツロウを含有しています。

効能・効果

かぜの諸症状(のどの痛み、せき、たん、発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、くしゃみ、鼻水、鼻づまり)の緩和。


用法・用量

- 成人(15歳以上) 1回3錠
 11歳以上15歳未満 1回2錠
 5歳以上11歳未満 1回1錠
 1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。
 5歳未満の小児には服用させないで下さい。

〈用法及び用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になりたり品質が変わる。)
- (4) 水分が錠剤に付きますと、内容成分の変化の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないで下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (6) ピンのキャップは湿気などを避けるために使用のつどしっかりとめて下さい。



本製品についてのお問合せ

- ①お買上げのお店
- ②お客様相談室：明治薬品株式会社
電 話：03-3253-3451
受 付 時 間：9:00~17:00 (土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元
明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地