

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

〔効能・効果〕

かぜの諸症状（発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、頭痛、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法・用量〕

次の1回量を食後なるべく30分以内及び必要な場合には就寝前に服用してください。なお、服用の際は、添付の計量カップではかって服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
3歳以上7歳未満	4 mL	3回 また、止むを得ない場合には約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用 できます。
1歳以上3歳未満	3 mL	
6ヶ月以上1歳未満	2.4 mL	
3ヶ月以上6ヶ月未満	2 mL	
3ヶ月未満の乳児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 本剤は、小児用ですので、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ※ 3. 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
4. 本剤は、生後3ヶ月未満の乳児に服用させないでください。

〔成分と作用〕

24mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	300 mg	熱を下げ、頭痛や、関節・筋肉の痛みをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	8 mg	せきをしずめ、たんを切ります。
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	20 mg	
カンゾウエキス (原生薬換算量)	416 mg (1664 mg)	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5 mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	25 mg	頭痛をしずめます。
ニンジンエキス (原生薬換算量)	30 mg (201 mg)	かぜの諸症状で弱った身体を回復させ、体調をととのえます。

添加物として、精製白糖、D-ソルビトール液、ポリリン酸ナトリウム、クエン酸水和物、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、ベンジルアルコール、エチルバニリン、バニリン、香料を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 服用のつどピンの口の周囲をよく拭いてからキャップをしめてください。
5. 計量カップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
6. 使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。また、使用期限内であっても、開栓後はなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎0120-415-688
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1