

*印：2008年07月改訂
**印：2009年06月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に
読めるように大切に保存して下さい。

コフロンエース

* 第②類医薬品

本剤は一般咳、小児喘息、呼吸が苦しくなる気管支喘息などの咳嗽症、喘息疾患に優れた効果をあらわします。



使用上の注意

 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する鼻炎用内服薬。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (6) 次の症状のある人。 : 高熱、むくみ |
| (3) 高齢者。 | (7) 次の診断を受けた人。 : 心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病 |
| (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 | |

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚一発疹・発赤、かゆみ 消化器一悪心、嘔吐、食欲不振 精神神経系一めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重たくなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

効能・効果 感冒、気管支炎、咽喉炎、喘息などの鎮咳去痰

用法・用量 1日2～3回服用。大人1回10mL、15～8歳は1回5mL、7～5歳は1回3mL、4～2歳は1回1mL。(添付のコップで計量する。)

用法および用量に関する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 2歳未満には服用させないこと。

成分・分量

(30mL中) $\left\{ \begin{array}{l} \text{マ オ ウ} \cdots \cdots 5 \text{ g}、\text{キキョウ} \cdots \cdots 5 \text{ g} \\ \text{バ イ モ} \cdots \cdots 1 \text{ g}、\text{セッコウ} \cdots \cdots 15 \text{ g} \\ \text{キョウニン} \cdots \cdots 4.5 \text{ g}、\text{カンゾウ} \cdots \cdots 3.5 \text{ g} \end{array} \right\}$ のエキス…3,600mg
プラントール(車前草エキス)……………500mg
添加物として白糖、デヒドロ酢酸ナトリウムを含有する。

保管および取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤は沈殿を生じても薬効に影響はありません。よく振ってから服用すること。
- (5) 開栓後は冷暗所に保管すること。
- (6) 使用期間(外箱に記載)の過ぎたものは使用しないこと。

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

天野商事株式会社 お客様相談室

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

電 話：052-951-2340

受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)

有限会社 日本漢方医薬研究所

* 徳島県鳴門市北灘町櫛木字井ノ尻89-7

電 話：088-666-0678

受付時間：10：00～17：00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)

発売元

製造販売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

有限会社 日本漢方医薬研究所

* 徳島県鳴門市北灘町櫛木字井ノ尻89-7