

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

化膿止め軟膏

イプ-ルG

第2類医薬品

〈化膿性疾患用薬〉

◆ **イプ-ルG** は、サルファ剤（スルファジアジン）の殺菌作用により化膿をおさえ、さらに患部の治りを助ける成分を配合した化膿止め軟膏です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 湿潤やただれのひどい人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

成分・分量

（100g中）

成 分	含量	は た ら き
スルファジアジン	5.0g	殺菌作用により、患部の化膿を防ぎます。
酸化亜鉛	5.0g	患部の炎症や痛みをおさえるとともに、患部の浸出液を吸収し乾燥させます。
アラントイン	0.5g	肉芽形成作用により、新しい組織の生成を促進させます。

添加物として、d-ボルネオール、マクロゴール、ラノリン、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

包 装

15g

とびひ、めんちょうとは？

〈とびひ〉

黄色ブドウ球菌という細菌が皮ふに感染して化膿をおこす病気で、肌が赤くなり、周囲に水ぶくれができます。感染しやすいことからとびひ（飛び火）といわれています。

〈めんちょう・毛のう炎〉

黄色ブドウ球菌によっておきる毛穴の炎症で、黄色いうみを持ち、周囲がやや赤くはれます。顔にできるものを特にめんちょうといいます。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。

製造販売元：万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

電話：（0598）37-2088

受付時間：10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

電話：（052）951-2340

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

発売元
 天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元
 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142