

この添付文書は、お薬とともに保管し、使用の際には、よくお読み下さい。

添付文書改訂年月
2009年10月

⑩

第②類医薬品

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

新スコポサイン坐薬 (外用痔疾用薬)

プレドニゾロン酢酸エステル配合

新スコポサイン坐薬は、患部の急激な炎症を抑えるプレドニゾロン酢酸エステルやすばやく痛みを抑え持続性のあるリドカイン、止血作用のあるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、傷の治りを早めるアラントイン、殺菌消毒剤のクロルヘキシジン塩酸塩など5つの有効成分の働きにより、痔による痛み・出血・はれ・かゆみの症状にすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意

⊗ 1. してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと



2. 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

(2) 10日間位使用しても症状がよくなる場合

成分・分量

本品1個(1.8g)中

プレドニゾロン酢酸エステル……………1.0mg
リドカイン……………60.0mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………10.0mg
クロルヘキシジン塩酸塩……………5.0mg
アラントイン……………20.0mg
添加物としてハードファットを含有します。

【特 徴】

- ・主薬のプレドニゾロン酢酸エステルが炎症を抑え、リドカインなど4つの有効成分が、痔による痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた治療効果を発揮します。
- ・効果の発現を早くするため、体温ですみやかに溶解患部に直接作用するよう製剤化しております。
- ・急性疾患は勿論慢性化した症状にも効果を発揮します。

(裏面もお読み下さい)

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量


15歳以上：1回1個を肛門内に挿入して下さい。なお、1日3回まで使用できます。15歳未満の小児には使用させないこと。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用すること。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用すること。
- (2) 肛門にのみ使用すること。

【坐薬の取り出し方・挿入法】

(1)



保護ケースを1区切りとり離して下さい。

(2)



左図のように坐薬の太い部分を上の方にむけ、保護ケースの両面の端を軽く引き離して下さい。

(3)




人差し指を坐薬の底にあて、先から肛門内に入るまで指で十分に押し込んで下さい。

【痔のなおりをはやめるために】

- ・食事：便秘を整えるため、野菜・果物・海産物を適度に摂って下さい。アルコールはよくありません。
- ・入浴：血行を良くすることにより、うっ血を取り去り、患部を清浄にします。効果的です。
- ・排便：無理にいきまないようにし、排便後は肛門を清潔にしましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない1℃～30℃の涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 坐薬の先を下に向け、立てた状態で保管して下さい。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発 売 元：天野商事株式会社 お客様相談室 製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室
電 話：(052)951-2340 電 話：(03)3253-3451
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く) 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元
 天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元
 明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地