

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

〈外用湿疹・皮膚炎用薬〉

第2類医薬品

サイドミンAD軟膏

特長

主成分の吉草酸酢酸プレドニゾロンは、アンテドラッグといわれる種類のステロイド剤です。アンテドラッグとは、皮膚表面の患部で効果を示し、体内に吸収されると低活性となる薬剤のことです。

吉草酸酢酸プレドニゾロンは、湿疹、ただれ等の炎症を鎮めます。
クロタミトンは、湿疹、かぶれ等に伴う痒みを抑えます。
トコフェロール酢酸エステルは、血行を促進します。
イソプロピルメチルフェノールは、殺菌効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください。
 - 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
- 顔面には広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

(裏面へ続く)

効能・効果

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、ただれ、虫さされ、あせも、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

(用法・用量に関連する注意)

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 本剤の塗擦後わずかにほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。
- 本剤を塗擦後、使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

成分・分量

サイドミンAD軟膏は無色半透明の軟膏で、1g中の成分・分量及びその主なはたらきは次のとおりです。


成分	分量	はたらき
吉草酸酢酸プレドニゾロン	1.5 mg	湿疹、ただれ等の炎症を鎮めます。
クロタミトン	50 mg	湿疹、かぶれ等に伴う痒みを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	5 mg	血行を促進します。
イソプロピルメチルフェノール	1 mg	殺菌効果があります。


添加物としてマクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。
製造販売元：万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142
電話：(0598) 37-2088 受付時間：10：00～17：00 (土、日、祝日を除く)
発売元：天野商事株式会社 お客様相談室
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
電話：(052) 951-2340 受付時間：9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

発売元
 天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元
 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142