

金蛇精[®] ゴールドII

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意 (滋養強壯剤)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
妊婦または妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、本製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1)服用後、皮膚:発疹、消化器:胃部不快感、悪心等の症状があらわれた場合。
(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には服用を中止し、本製品を持って、医師又は薬剤師に相談すること 下痢、便秘。

効能・効果

- 滋養強壯 ● 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上) 1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。
15歳未満は服用しないでください。

成分・分量 1瓶(50mL)中

イカリソウエキス
(イカリソウとして1600mgに相当) …… 160mg
ニクジュヨウエキス
(ニクジュヨウとして480mgに相当) …… 120mg
ジオウエキス
(ジオウとして500mgに相当) …… 250mg

オウセイエキス
(オウセイとして432.9mgに相当) …… 130mg
ローヤルゼリー …… 100mg
クコシエキス
(クコシとして330mgに相当) …… 100mg
ニンジンエキス
(ニンジンとして804mgに相当) …… 120mg
ハンピチンキ
(ハンピとして100mgに相当) …… 0.5mL
タウリン …… 800mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム …… 5mg
ピリドキシン塩酸塩 …… 10mg
ニコチン酸アミド …… 20mg
無水カフェイン …… 50mg
添加物として白糖、D-ソルビトール、アミノ酢酸、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、塩化Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、プロピルパラベン、エチルアルコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、香料を含有します。(アルコール1.2mL以下)

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
特に日光下の高温の車内には放置しないでください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 一度フタを開けたらそのまま置かないで、一回の服用にしてください。
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈でんを生じることがありますが、よく振ってから服用してください。

製造販売元



明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

お客様相談室 03-3253-3451
9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)