

第2類医薬品

ローヤルゼストンG[®]

滋養強壯剤



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、本製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹等
消化器	胃部不快感、悪心等

(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、本製品を持って、医師又は薬剤師に相談してください。下痢、便秘。

成分・分量

1日量1瓶（50mL）中

ローヤルゼリー500mg
オウセイエキス(黄精432.9mgに相当)···130mg
ニンジンエキス(人參670mgに相当)···100mg
イカリソウエキス(イカリ草1600mgに相当)160mg
トコフェロール酢酸エステル10mg
ピリドキシン塩酸塩10mg
タウリン1000mg
無水カフェイン25mg

(アルコール1.0mL以下)

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、アミノ酢酸、クエン酸水和物、dl-リンゴ酸、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、エチルアルコール、グリセリン、バニリン、プロピレングリコール、香料を含有する。

効能・効果

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人（15歳以上）1回1瓶（50mL）を1日1回服用する。

15歳未満は服用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 一度フタを開けた後は、使用期限内でも、長期保存による服用はしないでください。

※ 本剤は生薬成分を配合した内服液です。まれに沈殿を生じることがありますが、よく振ってから服用してください。

製造販売元



明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

お客様相談室 03-3253-3451

9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)