

この添付文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

添付文書改訂年月
2008年12月

Ⓛ

第2類医薬品

新ソラシドン[®]内服液

乗物酔い薬



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
□のかわき、便秘

成分・分量 1日量2瓶(40mL)中

塩酸メクリジン 70mg
スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.5mg
無水カフェイン 60mg
添加物として白糖、エチルパラベン、エチルアルコール、トメントール、エチルバニリン、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有します。

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

(裏面もお読みください。)

用法・用量

乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に

年齢	服用量	
成人（15歳以上）	1回	1瓶（20mL）
7歳以上15歳未満	1回	$\frac{1}{2}$ 瓶（10mL）
7歳未満は服用しないこと		


なお、症状発現時に追加服用する場合には、4時間以上の間隔をおき、1日2回を限度として服用すること。

用法及び用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管及び取扱い上の注意



- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 開封後の長期保存による服用は避けること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます

- ①お買い上げのお店
- ②製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室
電話：(03)3253-3451
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)
- ③発売元：天野商事株式会社 お客様相談室
電話：(052)951-2340
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
 **天野商事株式会社**
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
製造販売元
 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地