

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸鎮痛・鎮痙薬

カイオン-N

第②類医薬品

使用説明書

私たちの体の中で一番病気の多いものの一つに消化器系の疾患があります。胸やけ、胃痛などはその一つです。カイオン-Nにはこれらの症状に合わせてつくられた下記の成分を含んでいます。

⚠【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 6歳未満の乳幼児
 - (2) 透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は、授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人 排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	皮 膚	精神神経系	そ の 他
症 状	発疹・発赤、かゆみ	頭 痛	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

【効能・効果】

胃痛、腹痛、さしこみ（疝痛、癢）、胃酸過多、胸やけ

【用法・用量】

次の量をいずれも1日3回服用してください。

年 齢	1 回 量
大人（15歳以上）	4 錠
8歳以上15歳未満	2 錠
8歳未満	服用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 12錠（4.2g）中

乾燥水酸化アルミニウムゲル…700mg ロートエキス散……………450mg
ケイ酸マグネシウム …………… 1000mg アミノ安息香酸エチル…600mg
炭酸水素ナトリウム……………900mg

添加物として銅クロロフィリンNa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 錠剤が光線により光って見えるときがありますが品質に問題はありません。

製造販売元・お問い合わせ先
松本製薬工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160
TEL 0748-88-3196