

添付文書（外箱表示のみ）

33 g × 2 コ入 33 g × 5 コ入 33 g × 10 コ入 3 品目共通

ミカサ浣腸 A - 3 3

第 2 類医薬品

ご使用の前に、この箱の説明文をよくお読みください。また、必要な時に読めるように保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

連用しないでください。（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになる。）

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人（流早産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
 - (3) 高齢者
 - (4) はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人
 - (5) 心臓病の診断を受けた人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

2～3 回使用しても排便がない場合

その他の注意

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

【成分・分量】

日局 グリセリン 50%

添加物として塩化ベンザルコニウムを含有

【効能・効果】

便秘

【用法・用量】

12才以上：1回1個（33g）を直腸内に注入します。それで効果のみられない場合は、さらに同量をもう一度注入してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本薬剤使用後は、便意が強まるまでしばらくがまんしてください。（使用後すぐに排便を試みると、薬剤のみが排出され、効果がみられないことがあります。）
- (3) 12才未満の小児には、使用させないでください。
- (4) 浣腸にのみ使用してください。（内服しないでください。）

【使用法】

- ① 容器先端のキャップを取りはずし、肛門部へなるべく深く挿入します。（滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。）
 - ② 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
 - ③ 薬液注入後、充分便意が強まってから排便してください。
- 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
 - 冬季は容器を温湯（40℃位）に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行きましょう。
- 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。（例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など）
- 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょう。
- 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳などを飲むと、便意をもよおしやすくなります。

製造販売元 報国製薬株式会社

大阪市東成区深江北3丁目18番3号

お客様相談室 06-6976-2507（9:00～17:00）