

第2類医薬品 健胃薬

二日酔・食べ過ぎ・飲み過ぎ

新ビオエ[®]内服液

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、本製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
2週間位服用しても症状がよくなる場合。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
5. 一度フタを開けたら、そのまま、保管しないで早めに服用して下さい。

※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがありますが、よく振ってから服用して下さい。

【成分・分量】1日量(3瓶)中

塩化カルニチン	600mg
オウバクエキス	200mg
カンゾウエキス	150mg
ケイヒチンキ	3.0mL
シヨウキョウチンキ	1.5mL
ニンジンエキス	60mg
ゲンチアナエキス	60mg
アカメガシワエキス	135mg

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、dl-リンゴ酸、フマル酸Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、トメントール、エタノール、香料を含有します。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(30mL)、1日3回を限度として服用する。なお、服用間隔は4時間以上おくこと。
(小児には服用させないで下さい。)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

 明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地
お客様相談室 ☎0120-53-3451
9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

発売元

 天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
お客様相談室 052-951-2340
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地