

この説明書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

Ⓔ

添付文書改訂年月
2010年12月

乳 酸 菌 製 剤

指定医薬部外品

新ビオチアスミン錠

整 腸 に

腸は胃で分解された食物を、さらに消化吸収して栄養分として肝臓へ送る大切な働きをもっています。この腸には多くの有益、有害細菌が繁殖しており、有害細菌が繁殖しすぎると腸内は異常発酵をきたし、せっかくの栄養分も吸収されなくなります。

新ビオチアスミン[®]錠は、乳酸菌末ラクトミンと複合消化酵素ビオチアスターゼ1000（でんぷん、たん白及びせんい素消化作用を有します）及びチアミン硝化物（ビタミンB₁）を配合した乳酸菌製剤です。ラクトミンの乳酸菌はストレプトコッカス・フェカリス菌で腸で繁殖しやすく、有害細菌の繁殖を抑えると共に整腸作用を発揮しますので、本剤は腸の働きを正常化すると共に消化作用も促進します。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合。

成分・分量、はたらき

新ビオチアスミン錠は成人1日量(15錠)中、次の成分を含みます。

成 分	分 量	主 な は た ら き
ラ ク ト ミ ン	75.0mg	乳酸を産生し、腸内の悪玉菌を減らし、腸の運動を整えます。
ビオチアスターゼ1000	52.5mg	糖質、たんぱく質、せんい素の消化を助けます。
チ ア ミ ン 硝 化 物	5.0mg	身体の生理機能に重要なビタミンB ₁ です。

添加物として、セルロース、リン酸水素Ca水和物、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、D-マンニトール、サッカリンNa水和物、ステアリン酸Mg、硬化油を含有します。

効能・効果

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘、消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感。

裏面もお読みください。

用法・用量


年齢	1回量	用法
成人（15歳以上）	5錠	いずれも1日3回、食後に服用してください。
11歳以上15歳未満	4錠	
8歳以上11歳未満	3錠	
5歳以上 8歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよくしめること。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

電話：(052)951-2340

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日、特定休日を除く）

製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：(03)3253-3451

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日、特定休日を除く）



発売元
天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号



製造販売元
明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地