

この説明書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

④

添付文書作成年月
2011年2月

第2類医薬品

下痢・食あたりに

キノシン[®]S「アマノ」

(下痢止め薬)

キノシン[®]S「アマノ」は日常起こりやすい食べ過ぎ・飲み過ぎ・寝冷えなどが原因の下痢や、食あたりなど食べ物が原因の下痢にも有効にはたらき、抗菌・止瀉・鎮痙作用により、下痢症状を改善します。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
3. 服用時は飲酒しないこと。
4. 1週間以上継続して服用しないこと。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある)
 - (4)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (5)小児。
 - (6)高齢者。
 - (7)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (8)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (9)次の症状のある人。
排尿困難
 - (10)次の診断を受けた人。
心臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

 - (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる可能性がある。

裏面もお読み下さい。

成分・分量，主なはたらき

キノシン®S「アマノ」は6カプセル中，次の成分を含みます。

成分	分量	主なはたらき
ベルベリン塩化物水和物	300mg	抗菌作用，整腸作用などを有し，下痢症状を改善します。
次硝酸ビスマス	540mg	腸内の異常発酵によって生じたものに作用し，下痢に効きます。
ロートエキス3倍散	180mg	鎮痛鎮痙剤であり，腹痛を改善します。
センブリ末	9mg	消化不良，食欲不振の改善作用があります。
ビオチン	60mg	食物の消化を助けます。

添加物としてトウモロコシデンプン，デキストリン，乳糖水和物，無水ケイ酸，ステアリン酸Mg，カプセルの添加物として青色1号，黄色5号，ラウリル硫酸Na，酸化チタン，ゼラチン含有します。

効能・効果

下痢，食あたり，はき下し，水あたり，くだり腹，軟便，腹痛を伴う下痢，消化不良による下痢


用法・用量

年齢	1回量	用法
成人（15歳以上）	2カプセル	1日3回毎食後服用して下さい。
8歳以上15歳未満	1カプセル	
8歳未満	服用させないで下さい。	

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2)〈カプセルの取り出し方〉

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り，取り出してお飲み下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる事があります。）
- (4)使用期限のすぎた製品は服用しないで下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

電話：052-951-2340

受付時間：9：00～17：00（土，日，祝日，特定休日を除く）

製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：03-3253-3451

受付時間：9：00～17：00（土，日，祝日，特定休日を除く）