

かぜなどの熱で

体がだるい

食欲がない

そんな時の  
栄養補給に **ノンカフェイン**  
1日2本  
服用

カンゾウ  
エキス

ニンジン  
エキス

タウリン  
配合

キリージェ・リコ

第2類医薬品 30mL

# キリージェ・リコ

## 【成分・分量】1日量(30mL×2)中

タウリン(アミノエチルスルホン酸)2000mg、カンゾウエキス1000mg、ニンジンエキス60mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、パンテノール30mg 添加物:果糖、ポリリン酸Na、アルギン酸プロピレングリコールエステル、パラベン、デヒドロ酢酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料

## 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

## 【用法・用量】


成人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。  
○用法・用量を厳守すること。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。  
※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

発売元  
**AMANO** 天野商事株式会社  
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

お客様相談室 052-951-2340

製造販売元  
 中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

# 第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと

**🗨 相談すること**  
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931  
ガラス:ビン 金属:キャップ

製造番号

使用期限



01KJELAM