

*印：2013 年 01 月改訂

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に
読める様に大切に保存して下さい。

ワンダーエース

第Ⅱ類医薬品

本剤は、感冒、咽喉炎、へんとう腺炎などの症状に効果をあらわします。

*



使用上の注意

☒ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬

2. 長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。《高熱、むくみ》

(6) 次の診断を受けた人。

《甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病》

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発 疹 ・ 発 赤 、 か ゆ み
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれて、 徐々に強くなる。

3. 5 ～ 6 回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること。

効能・効果 感冒、咽喉炎、へんとう腺炎。

用法・用量 一日 3 回服用する。

用法・用量に関する注意

年 齢	1 回 量
大 人	10mL
15 ～ 8 才	5 mL
7 ～ 5 才	3 mL
5 才 未 満	服用しないこと。

(1) 定められた用法・用量を厳守すること。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督の
もとに服用させること。

成分・分量 ● カッコンエキス ……………800mg

(30mL 中) ● { マオウ4g、ハング5g、コウボク2g } のエキス…2,800mg
● { カンゾウ1g、ケイヒ3g、ヤカン5g }

● ブラントール（車前草エキス）……………500mg

添加物として白糖、デヒドロ酢酸ナトリウムを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 本剤は沈殿を生じても薬効に影響はありません。
よく振ってから服用すること。

(5) 開栓後は冷暗所に保存すること。

(6) 使用期限(外箱に記載)の過ぎたものは使用しないこと。

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は
下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

天野商事株式会社 お客様相談室

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

電 話：0 5 2 - 9 5 1 - 2 3 4 0

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日及び弊社休業日を除く）

有限会社 日本漢方医薬研究所

徳島県鳴門市北灘町櫛木字井ノ尻89-7

電 話：0 8 8 - 6 6 6 - 0 6 7 8

受付時間：10：00～17：00（土、日、祝日及び弊社休業日を除く）

発売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元

有限会社 日本漢方医薬研究所

徳島県鳴門市北灘町櫛木字井ノ尻89-7