

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品
解熱鎮痛薬

腰痛、神経痛、肩こり痛、発熱に セメジン顆粒

〈シャクヤク・カンゾウエキス配合〉

腰痛・神経痛・肩こり痛・発熱に効くアセトアミノフェンと筋肉のこわばりに働く
シャクヤクエキス・カンゾウ乾燥エキス、さらに体温調節中枢に働く地竜乾燥エキ
スを配合する解熱鎮痛薬です。
いわゆる貼り薬のような匂う、かぶれる、目立つといった心配のない内服療法薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
- 次の人は服用しないでください
（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（2）本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
 - 服用前後は飲酒しないでください
 - 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。
むくみ
（6）次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服
用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療
を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（ステイ ーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、急 性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚 の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブ ツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続 したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、 全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛 （節々が痛む）、下痢等があらわれる。

裏面も必ずお読みください

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3．5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書
を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 頭痛・歯痛・拔牙後の疼痛・咽喉痛（のどの痛み）・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・
筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み（ねんざ痛）・月経
痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 寒寒（発熱によるさむけ）・発熱時の解熱

【用法・用量】

次の1回量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用限度	服用間隔
成人（15歳以上）	1 包	2 回	6 時間以上
11歳以上15歳未満	2/3包		
7 歳以上11歳未満	1/2包		
3 歳以上 7 歳未満	1/3包		
3 歳未満の乳幼児	服用しないでください。		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分と作用】

1 日量〔2 包（1 包：2 g）〕中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
地竜乾燥エキス （原生薬換算量）	260mg (2000mg)	体温調節中枢を鎮静し、体表面の血行 をよくし、解熱効果をあらわします。
シャクヤクエキス （原生薬換算量）	200mg (2000mg)	抗炎症作用や鎮けい作用により、筋肉の はげしい痛みにも効果があります。
カンゾウ乾燥エキス （原生薬換算量）	400mg (2000mg)	
アセトアミノフェン	600mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、中枢 性の解熱・鎮痛効果をあらわします。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ケイヒ油、ウイキョウ油を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は生薬エキスをを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることが
ありますが、効果にはかわりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限（外箱及び袋に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
- 1 包を分割して、服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、 2 日以内に服
用してください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い申し上げます。

発 売 元：天野商事株式会社 お客様相談室 製造販売元：日新薬品工業株式会社 お客様相談室
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80－1
電 話：(052)951－2340 電 話：(0748)88－4156
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く) 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120－149－931

発売元  天野 商 事 株 式 会 社 製造販売元 日新薬品工業株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80－1