

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

柴胡桂枝湯エキス配合
かぜ薬

ガン®**顆粒KA-II** 第2類医薬品



くしゃみ、鼻水、発熱、頭痛など、かぜの症状がではじめたら、こじらせる前にできるだけ早く治すことが大切です。ガン®顆粒 KA-IIは、生薬からなる柴胡桂枝湯エキスと解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤、去痰剤などを効果的に配合した顆粒状のかぜ薬で、かぜの諸症状をやわらげ、健康な体への回復をたずけます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
 - 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
 - 服用前後は飲酒しないでください
 - 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をすするときせーせー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

(裏面へ続く)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

かぜの諸症状(悪寒、発熱、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ)の緩和

【用法・用量】

下記1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量
15歳以上	1 包
11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包
3歳以上7歳未満	1/3包
1歳以上3歳未満	1/4包
1歳未満	服用しないこと



<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【主成分とその主な作用】 本品1日量〔3包(1包1.15g)〕中に、次の成分を含有します。

成 分	分 量	主 な 作 用
柴胡桂枝湯エキス (柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、 人参、大棗、甘草、乾生姜)	760mg (処方換算量5168mg)	発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、吐き気などのあるかぜに特に効果があります。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、はげしいせきをしずめ、のどを楽にします。
グアヤコールスルホン酸 カリウム	240mg	のどにからむ痰をやわらかくし、出やすくします。
無水カフェイン	75mg	脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をやわらげ、眠気を防止します。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg	ビタミンB ₂ を補給し、体力の回復をたすけます。
合成ケイ酸アルミニウム	1200mg	胃の粘膜を保護し、他成分による胃腸障害をおさえます。


添加物として、アスピルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、乳糖、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包の分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。

天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052) 951-2340

受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)



発売元
天野商事株式会社
名古屋市中央区丸の内三丁目13番12号



製造販売元
アスゲン製薬株式会社
名古屋市東区泉二丁目28-8