

2014年2月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)
(下線部：使用上の注意の改訂)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

小青竜湯エキス配合
総合かぜ薬

ガン®**顆粒SR** 第2類医薬品



かぜをひくと、一般的に鼻水、くしゃみ、のどの痛みなどの症状があらわれます。さらに症状が進むと熱がでたり、からだのだるい、せきがでるなどの症状になります。ガン顆粒SRはこうしたかぜの諸症状を緩和する成分とともに漢方処方である小青竜湯エキスを配合しました。特に鼻水が出て少し症状の進んだかぜにすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 呼吸器 | 息切れ、息苦しさ |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |

(裏面へ続く)



| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水又はお湯にて服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|-------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1包 | 3回食後 |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包 | |
| 7歳以上11歳未満 | 1/2包 | |
| 3歳以上7歳未満 | 1/3包 | |
| 1歳以上3歳未満 | 1/4包 | |
| 1歳未満 | 服用しないでください。 | |



＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法：用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【主成分とその主な作用】

| 成 分 | 本品1日量 [3包(1包2g)]中 | 主 な 作 用 |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 小青竜湯乾燥エキス | 900mg | 鼻水、鼻づまり、のどの痛み、せきなどのあるかぜに効果があります。 |
| アセトアミノフェン | 900mg | 熱を下げ、痛みをしずめます。 |
| デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物 | 48mg | せき・たんをしずめます。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3.5mg | かぜのアレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。 |
| グアヤコールスルホン酸カリウム | 250mg | のどにからむたんをやわらかくし、出しやすくします。 |
| 無水カフェイン | 150mg | 頭痛をしずめます。 |
| リポフラビンリン酸エステルナトリウム | 12mg | かぜなどで消耗するビタミンの補給。 |


※添加物としてサッカリンNa、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、乳糖を含有します。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤に含まれているリポフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能には変わりありません。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。

天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)

販売元

 天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

発売元

アスケン製薬株式会社

製造販売元

神農製薬株式会社
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1