

第2類医薬品

金蛇精[®]DI

 **使用上の注意** (滋養強壯剤)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
皮ふ: 発疹、消化器: 胃部不快感、悪心等
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢

効能・効果

- 滋養強壯 ● 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上) 1回1瓶(50mL)を1日1回服用して下さい。

成分・分量 1瓶(50mL)中

ローヤルゼリー	150mg
ゴオウチンキ(牛黄2mgに相当)	0.2mL
ハンピチンキ(反鼻40mgに相当)	0.2mL
ニンジンエキス(人參636.5mgに相当)	95mg
インヨウカクエキス(淫羊藿500mgに相当)	50mg
クコシエキス(枸杞子66mgに相当)	20mg
L-リシン塩酸塩	300mg
L-アルギニン塩酸塩	50mg
タウリン	300mg
アスパラギン酸カリウム・ マグネシウム等量混合物	200mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
カルニチン塩化物	100mg
無水カフェイン	50mg

(アルコール1.2mL以下)

添加物として、安息香酸Na、ブチルパラベン、液糖、D-ソルビトール、グリシン、クエン酸水和物、dl-リンゴ酸、酒石酸、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、塩化Na、カラメル、エチルアルコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
特に日光下の高温の車内には放置しないで下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れかえないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 一度フタを開けたらそのまま置かないで、一回の服用にして下さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがありますが、よく振ってから服用して下さい。

製造販売元



明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

お客様相談室 ☎0120-53-3451
9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)