

この説明書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

添付文書改訂年月  
2010年2月

Ⓕ

乗物酔いに

**ソラシドン**<sup>®</sup>  
SORASHIDON

第2類医薬品

ソラシドン<sup>®</sup>は乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和を目的とする乗物酔いの薬です。



### 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）

#### 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気や目のかすみがあられることがある。)



相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。

排尿困難

- (6)次の診断を受けた人。

緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	排尿困難

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

□のかわき

### 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

(裏面もお読み下さい)

## 用法・用量

年齢	1回量	用法
成人（15歳以上）	2錠	1日1回服用して下さい。 ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分前に服用して下さい。
7歳～14歳	1錠	
7歳未満	服用させないで下さい。	

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2)錠剤の取り出し方：

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 成分・分量

ソラシドンは2錠中、次の成分を含みます。

成分	分量
塩酸メクリジン	50mg

添加物として、D-マンニトール、セルロース、カルメロースNa、硬化油、ステアリン酸Mg、l-メントールを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。  
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

## 包装

10錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：☎0120-53-3451

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日、特定休日を除く）

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

電話：052-951-2340

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日、特定休日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



発売元

**天野商事株式会社**  
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号



製造販売元

**明治薬品株式会社**  
富山県富山市三郷6番地