添付文書改訂年月 2013年1月

(記載要領変更に伴う改訂) 下痢・食あたりに

第2類医薬品

# **4/13**577/

(下痢止め薬)

キノシン®S「アマノ」は日常起こりやすい食べ過ぎ・飲み過ぎ・寝冷えなどが原因の下痢や、食あたりなど食べ物が原因の下痢にも有効にはたらき、抗菌・止瀉・鎮痙作用により、下痢症状を改善します。



#### 使用上の注意

## してはいけないこと(



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
  - 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
- 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
  - (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
- 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
- 4. 服用前後は飲酒しないこと。
- 5. 1週間以上継続して服用しないこと。

## 相談すること



- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。 (本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある)
  - (4)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (5)小児。
  - (6)高齢者。
  - (7)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (8)次の症状のある人。

排尿困難

(9)次の診断を受けた人。

心臟病,胃:十二指腸潰瘍,緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤,かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

口のかわき, 目のかすみ

4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### その他の注意

母乳が出にくくなることがある。

裏面もお読み下さい。

(R)

### 成分・分量、主なはたらき

キノシン®S「アマノ」は6カプセル中、次の成分を含みます。

成 分	分量	主なはたらき
ベルベリン塩化物水和物	300mg	抗菌作用,整腸作用などを有し,下 痢症状を改善します。
次硝酸ビスマス	540mg	腸内の異常発酵によって生じたもの に作用し,下痢に効きます。
ロートエキス3倍散	180mg	鎮痛鎮痙剤であり、腹痛を改善します。
センブリ末	9mg	消化不良, 食欲不振の改善作用があ ります。
ビオヂアスターゼ1000	60mg	食物の消化を助けます。

添加物としてトウモロコシデンプン、デキストリン、乳糖水和物、無水ケイ酸、ステ アリン酸Mg,カプセルの添加物として青色1号,黄色5号,ラウリル硫酸Na,酸化 チタン、ゼラチンを含有します。

#### 効能・効果

下痢,食あたり,はき下し,水あたり,くだり腹,軟便,腹痛を伴う下痢,消化不良に よる下痢

用法・用量				
年 齢	10量	用法		
成人(15歳以上)	2カプセル	1日3回毎食後服用して下さい。		
8歳以上15歳未満	1カプセル	1日3回母民後服用して下さい。		
8歳未満	服用させないで下さい。			

#### [用法及び用量に関連する注意]

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 〈カプセルの取り出し方〉

右図のようにカプセルの入っているPTP シートの凸部を指先で強く押して裏面のア ルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。 (誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘 膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりま す。)



#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい 所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる事があり ます。)
- (4)使用期限のすぎた製品は服用しないで下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申しあげます。

発 売 元:天野商事株式会社 お客様相談室 製造販売元:明治薬品株式会社 お客様相談室

電 話:052-951-2340 話:03-3253-3451 雷

受付時間:9:00~17:00(土,日,祝日,特定休日を除く) 受付時間:9:00~17:00(土,日,祝日,特定休日を除く)

(AMAND) 天野商事株式会社 名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

☞ 明治薬品株式云孔

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 富山県富山市三郷6番地 電話0120-149-931(フリーダイヤル)