ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬　第2類医薬品

ビオヂアスA®顆粒

製品の特徴

●荒れた胃粘膜の炎症を抑え、修復して、保護します。アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、アルジオキサ、カンゾウ粗エキスの３種類の粘膜修復剤が効果的にはたらいて、胃粘膜を守ります。
●胃酸を効果的に中和します。合成ヒドロタルサイト、ケイ酸アルミン酸マグネシウムの２種類の制酸剤が胃の痛みの症状のもととなる過剰な胃酸を中和します。さらにロートエキスが胃の痛みをしずめ、胃酸の分泌をおさえます。
●胃のもたれ、食欲不振にすぐれた効果を発揮します。ビオヂアスターゼ2000、リパーゼAP６の２種類の消化酵素が食べ物のでんぷん、たん白質、脂肪を胃の中で消化(分解)し、弱った胃の負担を減らします。
●胃の症状に合わせて食間(空腹時)あるいは食後に服用できます。空腹時の胃の痛み・不快感の症状がある方は、食間の服用をお薦めします。食後の胃のもたれ、食べすぎの方は、食後の服用をお薦めします。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

１．次の人は服用しないでください。
　透析療法を受けている人。
２．本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
　胃腸鎮痛鎮痙薬
３．授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。
　(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
４．長期連用しないでください。

相談すること

１．次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
　(1)　医師の治療を受けている人。
　(2)　妊婦又は妊娠していると思われる人。
　(3)　高齢者
　(4)　本人又は家族がアレルギー体質の人。
　(5)　薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
　(6)　次の症状のある人。
　　排尿困難
　(7)　次の診断を受けた人。
　　腎臓病、心臓病、緑内障
２．次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
　(1)　服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症　　状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

　(2)　２週間位服用しても症状がよくならない場合
３．次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
　口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能又は効果

胃痛、胃部不快感、胸やけ、飲みすぎ(過飲)、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、胃重、げっぷ(おくび)、胃弱、消化不良、食べすぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

裏面もお読みください