

200mL

[販売名]

補全-S

(漢方製剤)

第2類医薬品

押して開ける

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

〔成分・分量〕 1日量(10mL)中

十全大補湯エキス1,000mg配合

本エキス1,000mgは下記の生薬より抽出したものです。

ニンジン……………1.5g ソウジュツ …… 1.5g トウキ……………1.5g
 ジオウ……………1.5g ケイヒ……………1.5g オウギ……………1.5g
 ブクリョウ …… 1.5g シャクヤク …… 1.5g センキュウ …… 1.5g
 カンゾウ……………0.5g

添加物としてハチミツ、白糖、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、エチルアルコール、安息香酸Na、ブチルパラベン、バニリン、エチルバニリン、香料を含有します。(アルコールを含有します。)

〔効能・効果〕

体力虚弱なものの次の諸症：病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1回5mLを1日2回服用して下さい。よく振ってから服用して下さい。〈添付の目盛りカップ(5および10mL目盛付)で服用して下さい。〉15歳未満は服用させないで下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 服用のつどピンの口の周囲を清潔に拭いてからキャップをしめて下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 一度フタを開けた後は、なるべく長期間の服用は避けて下さい。

※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがありますが、よく振ってから服用して下さい。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

本製品内容についてのお問い合わせ

- お買上げのお店
- 製造販売元:明治薬品株式会社
お客様相談室 ☎0120-53-3451
9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

