

この説明書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

①

添付文書改訂年月
2010年9月

食べすぎ・胃もたれ・消化不良

新**ビオチアス**[®]

消 化 薬

指定医薬部外品

米などの炭水化物が中心であった日本人の食生活も、最近では欧米化が進み、脂肪の摂取量が他の栄養素に比べて著しく伸びてきました。従って、これまでのでんぷん、たん白、せんの消化を助ける消化酵素剤に、脂肪を消化する酵素を高単位に含むものが望まれるようになりました。

新ビオチアス[®]は、ビオチアスターゼ2000、ニューラーゼの他、脂肪を消化するリパーゼAP12を配合した消化酵素剤です。食べ過ぎ、もたれの他、ストレスなどで弱った胃腸の働きも（消化促進、消化不良）助けます。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

透析療法を受けている人。

（添加物としてケイ酸Alを使用しています。）

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。

(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4)次の診断を受けた人。

腎臓病

（添加物としてケイ酸Alを使用しています。）

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)2週間位服用しても症状がよくなる場合。

裏面もお読み下さい。

成分・分量、はたらき

新ピオヂアスは成人1日量(9錠)中、次の成分を含みます。

成分	分量	主なはたらき
ピオヂアスターゼ2000	135mg	アミラーゼ(でんぷん消化酵素)を主に、プロテアーゼ(たん白消化酵素)、セルラーゼ(せんい素分解酵素)を含む複合消化酵素です。
リパーゼAP12	30mg	脂肪消化酵素で、ピオヂアスターゼ2000と協力し、食物中の脂肪の消化吸収を助けます。
ニュージー	90mg	たん白・脂肪消化酵素で、ピオヂアスターゼ2000と協力し、食物中のたん白・脂肪の消化吸収を助けます。

添加物として無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、炭酸Ca、白糖、乳糖水和物、セルロース、バレイショデンプン、ケイ酸Al、リン酸水素Ca水和物、硬化油、ステアリン酸Mg、オレンジ油を含有します。

効能・効果

消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感。

用法・用量

年齢	1回量	用法
15歳以上	3錠	いずれも1日3回、食後に服用して下さい。
8歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)5歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
特に日光下の高温の車内には放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよくしめること。
- (5)品質を保持するため容器内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないよう注意すること。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



包装

180錠、360錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052) 951-2340

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：(03) 3253-3451

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)



発売元

天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号



製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地